

EN: Complementary dietetic feed for poultry, pigs and ruminants to support the preparation for oestrus and reproduction

Directions for use

Poultry: 1000 ml per 1000 Liters water for drinking • Cattle: 5-10 ml per animal/day • Calves, sows: 2.5 ml per animal/day • Sheep, goats, pigs: 2-3 ml per animal/day over a period of at least 3 consecutive days, repetition as required. Birds: For females: during oestrus. For males: during periods of reproductive activity. Mammals: Cows: 2 weeks before the end of gestation until the next gestation is confirmed. Sows: 7 days before until 3 days after parturition and 7 days before until 3 days mating. Other female mammals: from the last part of gestation until the next gestation is confirmed. For males: during periods of reproductive activity. Attention should be paid to the total daily intake of selenium, avoiding levels of more than 0.5 mg per kg as calculated on final feed basis.

It is recommended that advice from a nutrition expert or veterinarian be sought before use and before extending the period of use.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Composition

1,2-propanediol
Sodium citrate

Analytical constituents

Crude protein	0.0%	Crude fibre	0.0%
Crude fats	16.9%	Crude ash	0.25%
Lysine	0.0%	Methionine	0.0%
Sodium	0.2%	Moisture	69.0%

Additives per kg:

- Compounds of trace elements
- Sodium selenite (3b801) 50 mg
- Vitamins, provitamins
- Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700) 100,000 IU
- Preservatives:
- Formic acid / sodium formate (1k2371) 2.03 g
- Citric acid (1a330) 0.12 g
- Antioxidants
- Butylated hydroxyanisole(BHA) (1b320) 240 mg
- Propyl gallate (E 310) 240 mg

Best before: 12 months after the date of manufacture

Storage: Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

NL: Aanvullend diervoeder voor pluimvee, varkens en herkauwers ter ondersteuning van de voorbereiding op bront en voortplanting

Gebruiksaanwijzing

Pluimvee: 1000 ml per 1000 liter drinkwater • Koeien: 5-10 ml per dier per dag • Kalveren, zeugen: 2,5 ml per dier per dag • Schapen, geiten, vleesvarkens: 2-3 ml per dier per dag gedurende een periode van min. 3 dagen, indien gewenst herhalen. Vogels: Voor vrouwelijke dieren: tijdens de bront. Voor mannelijke dieren: tijdens de perioden van reproductieve activiteit. Zoogdieren: Koeien: 2 weken voor het einde van de dracht, tot de volgende dracht is bevestigd. Zeugen: 7 dagen vóór tot 3 dagen na het werpen en 7 dagen vóór tot 3 dagen na de dekking. Andere vrouwelijke zoogdieren: vanaf het einde van de dracht, tot de volgende dracht is bevestigd. Mannelijke dieren: tijdens de perioden van reproductieve activiteit. De totale dagelijkse opname van selenium moet in acht genomen worden om nivo's van meer dan 0,5 mg per kg gerekend op eindvoerbasis te voorkomen.

Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een voedingsdeskundige of dierenarts te raadplegen.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Samenstelling

1,2-propanediol
Natriumcitraat

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0.0%	Ruwe celstof	0.0%
Ruw vet	16.9%	Ruwe as	0.25%
Lysine	0.0%	Methionine	0.0%
Natrium	0.2%	Vocht	69.0%

Toevoegingsmiddelen per kg:

- Verbindingen van sporenelementen
- Natriumseleniet (3b801) 50 mg
- Vitaminen, provitaminen
- Vitamin E (all-rac-alpha-tocopherylacetate) (3a700) 100,000 IE
- Conserveermiddelen
- Mierenzuur / Natriumformiaat (1k2371) 2.03 g
- Citronenzuur (1a330) 0.12 g
- Antioxidanten
- Butylhydroxyanisool (BHA) (1b320) 240 mg
- Propylgallaat (E 310) 240 mg

Ten minste houdbaar tot: 12 maanden na productie datum

Opslag: Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

DE: Diät-Ergänzungsfuttermittel für Geflügel, Schweine und Wiederkäuer zur Unterstützung der Brunstvorbereitung und der Fortpflanzung

Gebrauchsanweisung

Geflügel: 1000 ml pro 1000 Liter Tränkwasser • Rinder: 5-10 ml pro Tier und Tag • Kälber, Sauen: 2,5 ml pro Tier und Tag • Schafe, Ziegen, Schweine: 2-3 ml pro Tier und Tag für mind. 3 aufeinanderfolgende Tage, bei Bedarf wiederholen. Vögel: Für weibliche Tiere: während des Oestrus. Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität. Säugetiere: Kühe: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit. Sauen: 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung. Sonstige weibliche Säugetiere: ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit. Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität. Die tägliche Gesamtaufnahme von Selen sollte die vorgeschriebene Grenze von 0,5 mg pro kg Alleinfuttermittel nicht überschreiten.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Zusammensetzung

1,2-Propanediol
Natriumcitraat

Analytischen Bestandteile und Gehalte

Rohprotein	0.0%	Rohfaser	0.0%
Rohöl	16.9%	Rohasche	0.25%
Lysin	0.0%	Methionin	0.0%
Natrium	0.2%	Feuchte	69.0%

Zusatzstoffe pro kg:

- Verbindungen von Spurenelementen
- Natriumselenit (3b801) 50 mg
- Vitamine, Provitamine
- Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) (3a700) 100,000 IE
- Konservierungsmittel
- Ameisensäure / Natriumformiat (1k2371) 2.03 g
- Zitronensäure (1a330) 0.12 g
- Antioxidationsmittel
- Butylhydroxyanisol (BHA) (1b320) 240 mg
- Propylgallat (E 310) 240 mg

Mindestens haltbar bis: 12 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung: Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



FR: Aliment complémentaire diététique pour volailles, porcs et ruminants soutenir la préparation à l'œstrus et à la reproduction

Mode d'emploi

Volailles : 1000ml pour 1000 litres d'eau de boisson • Bovins : 5-10ml par dier per dag • Veaux, truies: 2,5ml par animal/jour • Moutons, chèvres, porc : 2-3ml par animal/jour sur une période de min. 3 jours consécutifs, répéter selon les besoins. Oiseaux: Pour les femelles: pendant l'œstrus. Pour les mâles: pendant les périodes d'activité reproductrice. Mammifères: Vaches: deux semaines avant la fin de la gestation jusqu'à la confirmation de la gestation suivante. Truies: sept jours avant jusqu'à trois jours après la parturition et sept jours avant jusqu'à 3 jours après l'accouplement. Autres mammifères femelles: de la dernière partie de la gestation jusqu'à la confirmation de la gestation suivante. Mâles: pendant les périodes d'activité reproductrice. Vérifier la quantité totale de sélénium ingérée/ jour, en évitant des niveaux supérieurs à 0,5 mg/kg, calcul sur la base de l'aliment complet final.

Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un expert en alimentation ou d'un vétérinaire.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Composition 1,2-propanediol Citrato de sodio

Composition analytique

Protéine brute	0,0%	Cellulose brute	0,0%
Matières grasses brutes	16,9%	Cendres brutes	0,25%
Lysine	0,0%	Méthionine	0,0%
Sodium	0,2%	Humidité	69,0%

Additifs par kg:

- Composés d'oligo-éléments
Sélénite de sodium (3b801) 50 mg
- Vitamines, provitamines
Vitamine E (Acétate de tout-rac- α -tocophéryle) (3a700) 100,000 UI
- Conservateurs
Acide formique / Formiate de sodium (1k2371) 2.03 g
Acide citrique (1a330) 0.12 g
- Antioxygènes
Butylhydroxyanisol (BHA) (1b320) 240 mg
Gallate de propyle (E 310) 240 mg

À utiliser de préférence avant: 12 Mois après la date de fabrication

Stockage: Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

ES: Pienso complementario Dietéticos para aves de corral, cerdos y ruminantes apoyar la preparación para el celo y la reproducción

Instrucciones de uso

Aves: 1000ml por 1000 litro de agua de bebida • Bovinos: 5-10ml por animal y día • Terneros, Cerdas: 2,5ml por animal y día • Ovejas, cabras, porcino en crecimiento: 2-3ml por animal y día durante un periodo de min. 3 días consecutivos, repetición según necesidad. Aves: Hembras: durante el celo. Machos: durante los periodos de actividad reproductiva. Mammíferos: Vacas: 2 semanas antes del final de la gestación hasta que se confirme la siguiente. Cerdas: de 7 días antes del parto hasta 3 días después y de 7 días antes del apareamiento hasta 3 días después. Otros mamíferos hembras: desde la última parte de la gestación hasta que se confirme la siguiente. Machos: durante los periodos de actividad reproductiva. Se debería prestar atención al consumo total diario de selenio, evitando niveles superiores a 0,5 mg/kg, calculados en pienso.

Se recomienda consultar a un experto en nutrición o un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

Composición 1,2-propanediol Citrato de sodio

Componentes analíticos

Proteína bruta	0,0%	Fibra bruta	0,0%
Grasa bruta	16,9%	Ceniza bruta	0,25%
Lisina	0,0%	Metionina	0,0%
Sodio	0,2%	Humedad	69,0%

Additivos por kg:

- Compuestos de oligoelementos
Selenito de sodio (3b801) 50 mg
- Vitamines, provitaminas
Vitamina E (acetato de todo-rac- α -tocoferilo) (3a700) 100,000 UI
- Conservantes
Ácido fórmico / Formiato de sodio (1k2371) 2.03 g
Ácido cítrico (1a330) 0.12 g
- Antioxidantes
Butilhidroxianisól (BHA) (1b320) 240 mg
Gallato de propilo (E 310) 240 mg

Utilizar preferentemente antes del: 12 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento: Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

IT: Mangime complementare dietetici per pollame, suini e ruminanti per sostenere la preparazione all'estro e alla riproduzione

Istruzioni per l'uso

Pollame: 1000 ml per 1000 litri di acqua da bere • Bovini: 5-10 ml per animale/giorno • Vitelli, scrofe: 2,5 ml per animale/giorno • Pecore, capre, suini da ingrasso: 2-3 ml per animale/giorno per un periodo min. di 3 giorni consecutivi, ripetere se necessario. Volatili: Per le femmine: durante l'estro. Per i maschi: durante i periodi di attività riproduttiva. Mammiferi: Vacche: 2 settimane prima della fine della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva. Scrofe: 7 giorni prima fino a 3 giorni dopo il parto e 7 giorni prima fino a 3 giorni dall'accoppiamento. Altri mammiferi femmine: dall'ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva. Maschi: durante i periodi di attività riproduttiva. Averne attenzione al consumo diario totale di selenio, non superare livelli di 0,5 mg/kg nel mangime completo.

Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

Composizione 1,2-propanediolo Citrato di sodio

Componenti analitici

Proteina grezza	0,0%	Cellulosa grezza	0,0%
Grassi grezzi	16,9%	Ceneri grezze	0,25%
Lisina	0,0%	Metionina	0,0%
Sodio	0,2%	Umidità	69,0%

Additivi per kg:

- Composti di oligoelementi
Selenito di sodio (3b801) 50 mg
- Vitamine, provitamine
Vitamina E (tutto-rac- α -tocoferile acetato) (3a700) 100,000 UI
- Conservanti
Acido formico / Natriumformiat (1k2371) 2.03 g
Acido citrico (1a330) 0.12 g
- Antiossidanti
Butilidrossianisolo (BHA) (1b320) 240 mg
Gallato di propile (E 310) 240 mg

Da consumarsi preferibilmente entro: 12 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione: Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08043 Granollers
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch
Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049