

EN: Dietetic mineral feed for cattle

Nutritional purpose: Long-term supply of grazing animals with trace elements and/or vitamins

Composition: Hydrogenated fat of rapeseed, Magnesium oxide, Salts of stearic acid.

Analytical constituents

Calcium	0,1%
Sodium	0,2%
Phosphorus	0%
Magnesium	0,9%

Additives:

Compounds of trace elements	Per kg	Average daily intake bolus
• Cobalt(II) carbonate	3 234 mg	2 mg
• Cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate (3b303)		
• Copper(II) oxide (3b404)	135.000 mg	84 mg
• Calcium iodate anhydrous (3b202)	6 624 mg	4 mg
• Manganese (II) oxide (3b502)	105.400 mg	66 mg
• Sodium selenite (3b801)	4 005 mg	3 mg
• Zinc oxide (3b603)	260.000 mg	163 mg

Vitamins, pro-vitamins and similar substances

• Vitamin A (Retinyl acetate) (3a672a)	4000000 IU	2500 UI
• Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)	1000000 IU	625 UI
• Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700)	10000 IU	6 UI

Directions for use: For cattle over 400 kg. Only 1 bolus over the period of action must be administered per animal. The bolus is active for 6 months. Use a suitable bolus applicator (bolus weight: 150 grammes).

Recommended: Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to be incorporated in a bolus, if applicable, shall be avoided. Before using, it is recommended to have advice from a nutritionist concerning:

- the balance of trace elements in the daily ration
- the trace elements status of the herd
- Period of release expected: 240 days.

Maximum period of release up to 270 days.

Daily release rate for trace element and/or vitamin ranges between 1 % and 0,15 %.

Protective measures to avoid exposure with cobalt by inhalation or by dermal route should be taken.

NL: Dieet mineraalvoeder voor rundervee

Voedingsdoel: Langdurige afgifte van sporenelementen en/of vitaminen aan weidevee

Samenstelling: Raapzaad vetten, gehydrogeneerd, Magnesiumoxide, Zouten van stearinezuur

Analytische bestanddelen:

Calcium	0,1%
Natrium	0,2%
Fosfor	0%
Magnesium	0,9%

Toevoegingsmiddelen:

Verbinding van sporenelement	Per kg	Gemiddelde dagelijkse afgifte bolus
• Kobalt(II) carbonaat-hydroxide (2:3)-monohydraat (3b303)	3 234 mg	2 mg
• Koper(II) oxide (3b404)	135.000 mg	84 mg
• Calciumjodaat, watervrij (3b202)	6 624 mg	4 mg
• Mangaan(II)oxide (3b502)	105.400 mg	66 mg
• Natriumseleniet (3b801)	4 005 mg	3 mg
• Zinkoxide (3b603)	260.000 mg	163 mg

Vitaminen, provitamine

• Vitamine A (Retinylacetaat) (3a672a)	4000000 IE	2500 UI
• Vitamine D3 (Cholecalciferol) (3a671)	1000000 IE	625 UI
• Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) (3a700)	10000 IE	6 UI

Gebruiksaanwijzing: Voor runderen zwaarder dan 400 kg. 1 bolus per dier toedienen, tijdens de periode van vrijgave. De bolus is 6 maanden werkzaam. Gebruik een geschikte bolusschietter voor toediening.

Aanbevelen: Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvan een maximumgehalte is vastgesteld, gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus.

Aangeraden wordt om vóór gebruik het advies van een dierenarts of een voederskundige in te winnen met betrekking tot:

- de balans van de sporenelementen in het dagelijkse rantsoen
- de status van het beslag met betrekking tot sporenelementen

Verwachte periode van vrijgave : 240 dagen. Maximale periode van vrijgave tot 270 dagen.

Dagelijkse vrijgave van sporenelementen en/of vitaminen varieert tussen de 1 % en 0,15 %. De bolus bevat 0% inert ijzer.

Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden

DE: Diät-mineralfutter für rinder

Ernährungsziel: Anhaltende Freisetzung von Spurenelemente und/oder Vitaminen an Weidevieh

Zusammensetzung: Rapssaat fette, gehärtet, Magnesiumoxid, Salze von tearinsäure

Analytische Bestandteile

Calcium	0,1%
Natrium	0,2%
Phosphor	0%
Phosphor	0,9%

Zusatzstoffe:

Verbindungen von Spurenelementen	Pro kg	Durchschnittliche tägliche Abgabe Bolus
• Kobalt(II) carbonat-hydroxid(2:3)-Monohydrat (3b303)	3 234 mg	2 mg
• Kupfer(II)-oxid (3b404)	135.000 mg	84 mg
• Kalziumjodat, wasserfrei (3b202)	6 624 mg	4 mg
• Mangan(II)-oxid (3b502)	105.400 mg	66 mg
• Natriumselenit (3b801)	4 005 mg	3 mg
• Zinkoxid (3b603)	260.000 mg	163 mg

Vitamine, Provitamine und ähnlichen Stoffen

• Vitamine A (Retinylacetaat) (3a672a)	4000000 IE	2500 UI
• Vitamine D3 (Cholecalciferol) (3a671)	1000000 IE	625 UI
• Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) (3a700)	10000 IE	6 UI

Gebruiksaanwijzing: Für Rinder über 400 kg. Während der Behandlungsdauer nur 1 Bolus pro Tier verabreichen. Der Bolus wirkt über 6 Monate. Geeigneten Bolus Applikator verwenden

Empfehlung: Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als denen in einem Bolus, falls zutreffend, ist zu vermeiden. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Ernährungswissenschaftlers einzuholen zu:

- der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente;
- dem Status des Bestands in Bezug auf Spurenelemente. Erwarteter Freigabezeitraum: 240 Tage. Maximaler Freigabezeitraum bis zu 270 Tagen.

Tägliche Freigabe von Spurenelemente oder Vitamine variiert zwischen 1 % und 0,15 %. Der Bolus enthält 0 % inertes Eisen zur Erhöhung der Dichte.

Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Kobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden.

FR: Aliment mineral diététique pour bovins

Objectif nutritionnel: Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l'étherage

Composition: Matières grasses de colza hydrogénées, Oxyde de magnésium, Sels d'acide stéarique.

Constituants analytiques:

Calcium	0,1%
Sodium	0,2%
Phosphore	0%
Magnésium	0,9%

Additifs:

Composés d'oligo-éléments	Au Kg	Apport journalier moyen par bolus
• Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté (3b303)	3 234 mg	2 mg
• Oxyde de cuivre(II) (3b404)	135.000 mg	84 mg
• Iodate de calcium anhydre (3b202)	6 624 mg	4 mg
• Oxyde de manganèse (II) (3b502)	105.400 mg	66 mg
• Sélénite de sodium (3b801)	4 005 mg	3 mg
• Oxyde de zinc (3b603)	260.000 mg	163 mg

Vitamines, provitamines et produits similaires

• Vitamine A (Acétate de rétinol) (3a672a)	4000000 UI	2500 UI
• Vitamin D3 (Cholécalcérol) (3a671)	1000000 UI	625 UI
• Vitamine E (Acétate de tout-rac-α-tocophéryle) (3a700)	10000 UI	6 UI

Mode d'emploi: Pour bovins de plus de 400 kg. Administrer un seul bolus par animal et par jour durant la période de traitement. Le bolus libère progressivement les oligo-éléments et les vitamines au cours d'une période de 6 mois. Utiliser un pistolet à bolus adapté (bolus de 150 grammes).

Recommandations: La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir des sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée. Avant utilisation, il est recommandé de consulter un nutritionniste au sujet:

- du dosage des oligo éléments dans la ration journalière
- du statut en oligo-éléments du troupeau
- Durée de défillement prévue à 240 jours.

Le taux de libération journalier des oligo éléments et vitamines varie entre 1 % et 0,15 %. Ce bolus contient 0% de fer inerte.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.

ES: ALIMENTO MINERAL DIETÉTICO PARA GANADO VACUNO

Objetivo nutricional: Suministro a largo plazo de oligoelementos y/o vitaminas para animales de pastoreo

Composición: Grasa de colza hidrogenado, Óxido de magnesio, Sales de ácido estearico

Componentes analíticos

Calcio	0,1%
Sodio	0,2%
Fósforo	0%
Magnesio	0,9%

Aditivos:

Compuestos de oligoelementos	Por kg	Ingesta diaria por bolus
• Hidróxido de carbonato de cobalto(II) (2:3) monohidratado (3b303)	3 234 mg	2 mg
• Óxido de cobre (II) (3b404)	135.000 mg	84 mg
• Yodato de calcio anhidro (3b202)	6 624 mg	4 mg
• Óxido de manganeso (II) (3b502)	105.400 mg	66 mg
• Selenito de sodio (3b801)	4 005 mg	3 mg
• Óxido de cinc (3b603)	260.000 mg	163 mg

Vitaminas, provitaminas y sustancias similares

• Vitamina A (Acetato de retinilo) (3a672a)	4000000 UI	2500 UI
• Vitamina D3 (Colecalciferol) (3a671)	1000000 UI	625 UI
• Vitamina E (acetato de todo-rac-α-tocoférol) (3a700)	10000 UI	6 UI

Instrucciones de uso: Para ganado vacuno con un peso superior a 400 kg. Solo 1 bolo por animal durante el periodo de administración. Liberación lenta durante 6 meses. Utilice un administrador de bolo adecuado.

Recommended: No administrar simultáneamente aditivos con un contenido máximo procedente de fuentes distintas de las que componen un bolo. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario o a un nutricionista lo siguiente:

- el equilibrio de oligoelementos en una ración diaria;
- la situación de los oligoelementos en la cabecera.

Periodo estimado de liberación: 240 días hasta un máximo de 270 días.

La tasa de liberación diaria de oligoelementos y/o vitaminas oscila entre el 1 % y el 0,15%. El bolus contiene 0% de hierro inerte.

Deberán tomarse medidas de protección a fin de evitar la exposición al cobalto por inhalación o por vía cutánea

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Europe:
Schippers Europe BV
Smargdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmélé 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

23 LV 03

The
Schippers
Group

Batch number/ número de lote/
Chargennummer/ número de
lote/ numero di lotto:

EXP:

Made in: France

Agreement :  FR 12 263 001

Download app!
Scan this product



1705041