

EN: Dietetic mineral feed for cattle

Nutritional purpose

Long-term supply of grazing animals with trace elements and/or vitamins

Composition:

Hydrogenated fat of rapeseed, Salts of stearic acid

Analytical constituents

Magnesium 0,02%
Calcium 0,39%
Sodium 0,23%
Phosphorus 0,00%

Additives

Compounds of trace elements

Per kg
• Zinc oxide 250 050 mg
(3b603)
• Copper(II) 200 025 mg
(3b404)
• Manganese(II) 77 500 mg
oxide (3b502)
• Selenium 4 005 mg
(3b801)-Sodium selenite
• Calcium iodate 25 344 mg
anhydrous (3b202)
• Cobalt(II) 9 088 mg
carbonate hydroxide (2:3)
monohydrate (3b303)

Vitamins, pro-vitamins and similar substances

5 000 000 UI 4167 UI
• Vitamin A (Retinyl acetate) (3a672a)
1 600 000 UI 1333 UI
• Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
10 000 UI 8,3 UI
• Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700)

Directions for use

For cattle over 400 kg. Only 1 bolus over the period of action must be administered per animal. The bolus is active for 6 months. Use a suitable bolus applicator (bolus weight: 150 grammes).

Recommended

Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to those incorporated in a bolus, if applicable, shall be avoided. Before using, it is recommended to have advice from a nutritionist concerning:
- the balance of trace elements in the daily ration
- the trace elements status of the herd
Period of release expected: 180 days.
Maximum period of release up to 200 days.

Daily release rate for trace element and/or vitamin ranges from 1,1 % and 0,25 %.

The bolus contains 0 % inert iron
Protective measures to avoid exposure with cobalt by inhalation or by dermal route should be taken.

NL: Dieet mineraalvoeder voor rundervee

Voedingsdoel

Langdurige afgifte van sporenelementen en/of vitaminen aan weidevee

Samenstelling

Raapzaad vetten, gehydrogeneerd, Zouten van stearinezuur

Analytische bestanddelen

Magnesium 0,02%
Calcium 0,39%
Natrium 0,23%
Fosfor 0,00%

Toevoegingsmiddelen

Verbinding van sporenelement

Per kg
• Zinkoxide 250 050 mg
(3b603)
• Koper(II) oxide 200 025 mg
(3b404)
• Mangaan(II) oxide 77 500 mg
oxide (3b502)
• Natriumseleniet 4 005 mg
(3b801)
• Calciumjodaat, 25 344 mg
watervrij (3b202)
• Kobalt(II) 9 088 mg
carbonaat hydroxide (2:3)
monohydraat (3b303)

Vitaminen, provitamine

5 000 000 IE 4167 IE
• Vitamin A (Retinylacetat) (3a672a)
1 600 000 IE 1333 IE
• Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
10 000 IE 8,3 IE
• Vitamin E (all-rac-alpha-tocoferylacetat) (3a700)

Gebruiksaanwijzing

Voor runderen zwaarder dan 400 kg. 1 bolus per dier toedienen, tijdens de periode van vrijgave. De bolus is 6 maanden werkzaam. Gebruik een geschikte bolusschietter voor toediening.

Aanbevelen

Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor een maximuminhoud is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus. Aanbevelen worden om vóór gebruik het advies van een dierenarts of een voederspecialist in te winnen met betrekking tot:
- de balans van de sporenelementen in het dagelijkse rantsoen
- de status van het beslag met betrekking tot sporenelementen
Verwachte periode van vrijgave: 180 dagen. Maximale periode van vrijgave tot 200 dagen.

Dagelijkse vrijgave van sporenelementen en/of vitaminen varieert tussen de 1,1 % en 0,25 %.

De bolus bevat 0 % inert ijzer
Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

DE: Diät-mineralfutter für rinder

Ernährungsziel

Anhaltende Freisetzung von Spurenelementen und/oder Vitaminen an Weidevieh

Zusammensetzung

Rapsaast fette, gehärtet, Salze von Stearinsäure

Analytische Bestandteile

Magnesium 0,02%
Calcium 0,39%
Natrium 0,23%
Phosphor 0,00%

Zusatzstoffe

Verbindungen von Spurenelementen

Pro kg
• Zinkoxid 250 050 mg
(3b603)
• Kupfer(II)-oxid 200 025 mg
(3b404)
• Mangan(II)-oxid 77 500 mg
oxid (3b502)
• Natriumselenit 4 005 mg
(3b801)
• Kalziumjodat, 25 344 mg
wasserfrei (3b202)
• Kobalt(II) 9 088 mg
carbonat hydroxide (2:3)
monohydrat (3b303)

Vitamine, Provitamine und ähnlichen Stoffen

5 000 000 IE 4167 IE
• Vitamin A (Retinylacetat) (3a672a)
1 600 000 IE 1333 IE
• Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
10 000 IE 8,3 IE
• Vitamin E (all-rac-alpha-tocopherylacetat) (3a700)

Gebrauchsanweisung

Für Rinder über 400 kg. Während der Behandlungsdauer nur 1 Bolus pro Tier verabreichen. Der Bolus wirkt über 6 Monate. Geeigneten Bolus-Applikator verwenden

Empfehlung:

Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als denen in einem Bolus, falls zutreffend, ist zu vermeiden.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Ernährungswissenschaftlers einzuholen zu: der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente;

- dem Status des Bestands in Bezug auf Spurenelemente
Erwarteter Freigabezeitraum: 180 Tage. Maximaler Freigabezeitraum bis zu 200 Tagen.

Tägliche Freigabe von Spurenelemente oder Vitamine variiert zwischen 1,1 % und 0,25 %. Der Bolus enthält 0 % inertes Eisen zur Erhöhung der Dichte.

Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Kobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden.

FR: Aliment mineral dietétique pour bovins

Objectif nutritionnel

Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l'élevage

Composition

Matières grasses de colza hydrogénées, Sels d'acide stéarique

Constituants analytiques

Magnésium 0,02%
Calcium 0,39%
Sodium 0,23%
Phosphore 0,00%

Additifs:

Composés d'oligo-éléments

Au Kg
• Oxyde de zinc 250 050 mg
(3b603)
• Oxyde de cuivre(II) (3b404)
• Oxyde de manganèse (II) (3b502)
• Sélénite de sodium (3b801)
• Iodate de calcium anhydre (3b202)
• Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté (3b303)

Vitamines, provitamines et produits similaires

5 000 000 UI 4167 UI
• Vitamine A (Acétate de rétinol) (3a672a)
1 600 000 UI 1333 UI
• Vitamine D3 (Cholecalciférol) (3a671)
10 000 UI 8,3 UI
• Vitamine E (Acétate de tout-rac-α-tocophéryle) (3a700)

Mode d'emploi

Pour bovins de plus de 400 kg. Administrer un seul bolus par animal et par jour durant la période de traitement. Le bolus libère progressivement les oligo-éléments et les vitamines au cours d'une période de 6 mois. Utiliser un pistolet à bolus adapté (bolus de 150 grammes).

Recommandations

La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir des sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée. Avant utilisation, il est recommandé de consulter un nutritionniste au sujet:

- du dosage des oligo éléments dans la ration journalière
- du statut en oligo éléments du troupeau
Durée de déliement prévue à 180 jours. Durée maximale de libération jusqu'à 200 jours.

Le taux de libération journalier des oligo éléments et vitamines varie entre 1,1 % et 0,25 %. Ce bolus contient 0% de fer inerte.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.

ES: ALIMENTO MINERAL DIETÉTICO PARA GANADO VACUNO

Objetivo nutricional

Suministro a largo plazo de oligoelementos y/o vitaminas para animales de pastoreo

Composición

Grasa de colza hidrogenado, Sales de ácido estearico

Componentes analíticos

Magnesio 0,02 %
Calcio 0,39 %
Sodio 0,23 %
Fósforo 0,00 %

Aditivos

Compuestos de oligoelementos

Por kg
• Óxido de cinc 250 050 mg
(3b603)
• Óxido de cobre 200 025 mg
(II) (3b404)
• Óxido de manganeso (II) (3b502)
• Selenito de sodio (3b801)
• Yodato de calcio 25 344 mg
anhidro(3b202)
• Hidróxido de cobalto(II) (2:3) monohidratado (3b303)

Vitamines, provitamines y sustancias similares

5 000 000 UI 4167 UI
• Vitamina A (Acetato de retinol) (3a672a)
1 600 000 UI 1333 UI
• Vitamina D3 (Colecalciferol) (3a671)
10 000 UI 8,3 UI
• Vitamina E (acetato de todo-rac-α-tocopherol) (3a700)

Instrucciones de uso

Para ganado vacuno con un peso superior a 400 kg. Solamente 1 bala por animal durante el periodo de administración. Liberación lenta durante 6 meses. Utilice un administrador de bala adecuado.

Recommended

No administrar simultáneamente aditivos con un contenido máximo procedente de fuentes distintas de las que componen un bolo. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario o a un nutricionista lo siguiente:

- el equilibrio de oligoelementos en una ración diaria;
- la situación de los oligoelementos en la cabala.
Periodo estimado de liberación: 180 días hasta un máximo de 200 días.

La tasa de liberación diaria de oligoelementos y/o vitaminas oscila entre el 1,1 % y el 0,25%. El bolus contiene 0% de hierro inerte.

Deberán tomarse medidas de protección a fin de evitar la exposición al cobalto por inhalación o por vía cutánea.

United Kingdom:

Schippers UK Ltd.
143-149 Finchchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: T733592049

Europe:

Schippers Europe BV
Smargdweg 60
5527 LB Aapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmélé 76
08403 Granollers
(Barcelona - España
Tel. 935 689 128

23 LV 03

