

EN: Dietetic mineral feed for bovines

Nutritional purpose Long-term supply of minerals to animals with trace elements and/or vitamins

Composition:
Hydrogenated fat of rapeseed
Salts of stearic acid

Analytical constituents:

Calcium 0,4%
Sodium 0,1%
Phosphorus 0%
Magnesium 0%

Additives:**Compounds of trace elements**

• Cobalt(II) 5040 mg
carbonate

hydroxide (2:3)
monohydrate
(3b303)

• Copper(II) 37.500 mg
oxide (3b404)

• Calcium iodate 24.832 mg
anhydrous
(3b202)

• Manganous oxide (3b502) 133.300 mg

• Sodium selenite (3b801) 2.025 mg

• Zinc oxide (3b603) 247.500 mg

Vitamins, provitamins

• Vitamin E 15.000 IU 30
(all-rac-alpha-tocopheryl acetate)
(3a700)

• Beta-carotene 10.000 mg 20
3a160(a)

Directions for use

For cattle over 400 kg.

Only 1 bolus over the period of action must be administered per animal. The bolus is active for 2 months. Use a suitable bolus applicator (bolus weight : 120 grammes).

Recommended

Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to those incorporated in a bolus, if applicable, shall be avoided. Before using, it is recommended to have advice from a nutritionist concerning: - the balance of trace elements in the daily ration - the trace elements status of the herd - Period of release expected: 60 days. Maximum period of release up to 75 days. Daily release rate for trace element and/or vitamin ranges between 2,2 % and 0,8 %.

The bolus contains 0 % inert iron. Protective measures to avoid exposure with cobalt by inhalation or by dermal route should be taken.

NL: Diët mineraalvoeder voor runderen.

Voedingsdoel: Langdurige afgifte van sporenelementen en/of vitaminen aan de weidevee

Samenstelling:
Raapzaad vetten, gehydrogeneerd
Zouten van stearinezuur

Analytische bestanddelen:

Calcium 0,4%
Natrium 0,1%
Fosfor 0%
Magnesium 0%

Toevoegingsmiddelen:

• Kobalt(II) 5040 mg
carbonaat-
hydroxide (2:3)
monohydraat
(3b303)

• Koper(II) oxide 37.500 mg
(3b404)

• Calcium jodaat, 24.832 mg
watervrij
(3b202)

• Mangaan(II) 133.300 mg
oxide (3b502)

• Natrium seleniet (3b801) 2.025 mg

• Zinkoxide (3b603) 247.500 mg

Vitaminen, provitaminen

• Vitamine E 15.000 IE 30
(all-rac-alpha-tocoferyl-
acetaat)
(3a700)

• Betacaroteen 10.000 mg 20
3a160(a)

Gebruiksaanwijzing

Voor runderen zwaardere dan 400 kg. 1 bolus per tier toedienen, tijdens de periode van vrijgave. De bolus is 2 maanden werkzaam. Gebruik een geschikte bolusschietter voor toediening.

Aanbevelen

Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor een maximumgehalte is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus. Aanbezing wordt om vóór gebruik het advies van een dierenarts of een voederskundige in te winnen met betrekking tot: - de balans van de sporenelementen in het dagelijks rantsoen; - de status van het beslag met betrekking tot sporenelementen Verwachte periode van vrijgave : 60 dagen. Maximale periode van vrijgave tot 75 dagen. Dagelijkse vrijgave van sporenelementen en/of vitaminen varieert tussen de 2,2 % en 0,8 %.

De bolus bevat 0% inert ijzer. Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan cobalt door inademing of via de huid te vermijden

DE: Diät-Mineralfuttermittel für Rinder

Ernährungsziel: Anhaltende Freisetzung von Spurenelemente und/oder Vitaminen an Weidevieh

Zusammensetzung:
Rapssaat fetten, gehärtet
Salze von tearnäure

Analytischen Bestandteile und Gehalte:

Calcium 0,4%
Natrium 0,1%
Phosphor 0%
Magnesium 0%

Zusatzstoffe:

• Cobalt(II) 5040 mg
carbonate
hydroxide (2:3)
monohydrate
(3b303)

• Kupfer(II)-oxid 37.500 mg
(3b404)

• Kaliumjodat, 24.832 mg
wasserfrei
(3b202)

• Mangan(II)-oxid (3b502) 133.300 mg

• Natriumselenit 2.025 mg
(3b801)

• Zinkoxid (3b603) 247.500 mg

Vitamine, Provitamine

• Vitamin E 15.000 IE 30
(all-rac-alpha-tocopheryl-
acetate)
(3a700)

• Beta-Carotin 10.000 mg 20
3a160(a)

Gebruiksaanwijzing

Für Rinder über 400 kg.

Während der Behandlungsdauer nur 1 Bolus pro Tier verabreichen. Der Bolus wirkt über 2 Monate. Geeigneten Bolus-Applikator verwenden

Empfehlung
Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als denen in einem Bolus, falls zutreffend, ist zu vermeiden. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Ernährungswissenschaftlers einzuholen: - der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente; - dem Status des Bestands in Bezug auf Spurenelemente. Erwarteter Freigabezeitraum: 60 Tage. Maximaler Freigabezeitraum bis zu 75 Tagen. Tägliche Freigabe von Spurenelemente oder Vitaminen variiert zwischen 2,2 % und 0,8 %.

Der Bolus enthält 0 % inertes Eisen zur Erhöhung der Dichte. Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Cobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden.

FR: Aliment minéral diététique pour bovins

Objectif nutritionnel: Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l'étherage

Composition:
Matières grasses de colza hydrogénées
Sels d'acide stéarique

Composition analytique:

Calcium 0,4%
Sodium 0,1%
Phosphore 0%
Magnésium 0%

Additifs:

• Carbonate d'oligo-éléments (2:3)
de cobalt(II)
monohydraté
(3b303)

• Oxyde de cuivre (II) 37.500 mg
(3b404)

• Iodate de calcium anhydre (3b202)

• Oxyde manganoux (3b502) 133.300 mg

• Sélénite (3b801) 2.025 mg

• Oxyde de zinc (3b603) 247.500 mg

Vitamines, provitamines

• Vitamine E 15.000 UI 30
(Acétate de tout-rac-alpha-tocophéryle)
(3a700)

• Bêta-carotène 10.000 mg 20
3a160(a)

Mode d'emploi

Pour bovins de plus de 400 kg.

Administrer un seul bolus par animal et par jour durant la période de traitement. Le bolus libère progressivement les oligo-éléments et les vitamines au cours d'une période de 2 mois. Utiliser un pistolet à bolus adapté (bolus de 120 grammes).

Recommandations

La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir des sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée. Avant utilisation, il est recommandé de consulter un nutritionniste au sujet: - du dosage des oligo-éléments dans la ration journalière - du statut en oligo-éléments du troupeau Durée de délivrement prévue à 60 jours. Durée maximale de libération jusqu'à 75 jours. Le taux de libération journalier des oligo-éléments et vitamines varie entre 2,2 % et 0,8 %. Ce bolus contient 0 % de fer inerte.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.

ES: Pienso mineral Dietéticos para bovinos

Objetivo nutricional: Suministro a largo plazo de oligoelementos y/o vitaminas para animales de pastoreo

Composición:
Grasa de colza hidrogenado
Sales de ácido esteárico

Componentes analíticos:

Calcio 0,4%
Sodio 0,1%
Fósforo 0%
Magnesio 0%

Aditivos:

• Hidróxido de carbonato de cobalto(II) (2:3) monohidratado (3b303)

• Óxido de cobre (II) (3b404)

• Yodato de calcio anhidro (3b202)

• Óxido manganeso (3b502) 133.300 mg

• Selenito de sodio (3b801) 2.025 mg

• Óxido de cinc (3b603) 247.500 mg

Vitaminas, provitaminas

• Vitamina E 15.000 UI 30
(acetato de todo-rac-alpha-tocofenilo)
(3a700)

• Beta-caroteno 10.000 mg 20
3a160(a)

Instrucciones de uso

Para ganado vacuno con un peso superior a 400 kg. Administrar 1 bolus por animal durante el periodo de administración. Liberación lenta durante 2 meses. Utilice un administrador de bolo adecuado.

Recommended

No administrar simultáneamente aditivos con un contenido máximo procedente de fuentes distintas de las que componen un bolo. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario o a un nutricionista lo siguiente: - el equilibrio de oligoelementos en una ración diaria; - la situación de los oligoelementos en la cabana. Período estimado de liberación: 60 días hasta un máximo de 75 días. La tasa de liberación diaria de oligoelementos y/o vitaminas oscila entre el 2,2 % y el 0,8 %. El bolo contiene 0 % de hierro inerte.

Deberán tomarse medidas de protección a fin de evitar la exposición al cobalto por inhalación o por vía cutánea

United Kingdom:

Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Europe:

Schippers Europe BV
Smardagweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:

Schippers France SARL
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmélé 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

23 LV 03

