

EN: Complementary dietetic feed for dairy cows
Reduction of the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia
It is recommended that a nutritional expert's opinion be sought before use

Directions for use
2 boluses 12 to 24 hours before calving. 2 boluses immediately after calving.

NL: Aanvullend diervoeder voor melkkoeien
Vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcaëmie
Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen

Gebruiksaanwijzing
2 bolussen 12 tot 24 uur voor het afkalven. 2 bolussen direct na het afkalven.

DE: Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkuhe
Verringerung des Risikos von Milchkreber und subklinischer Hypokalzämie
Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierernährungsberaters einzuholen.

Gebrauchsanweisung
2 Boli 12 bis 24 Stunden vor dem Kalben. 2 Boli direkt nach dem Kalben.

FR: Aliment complémentaire diététique pour vaches laitières
Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique
Il est recommandé de demander l'avis d'un nutritionniste avant utilisation

Mode d'emploi
2 bolus 12 à 24 heures avant le vêlage. 2 bolus immédiatement après le vêlage.

Composition
Dicalcium phosphate
Calcium carbonate
Magnesium phosphate
Chicory inulin

Analytical constituents
Crude protein 0,5%
Crude fats 5,4%
Crude fibre 1,5%
Crude ash 74,7%
Sodium 0,0%
Calcium 24,5%
Phosphorus 9,7%
Magnesium 0,8%

Samenstelling
Dicalciumfosfaat
Calciumcarbonaat
Magnesiumfosfaat
Cichoreï-inuline

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 0,5%
Ruw vet 5,4%
Ruw celstof 1,5%
Ruw as 74,7%
Natrium 0,0%
Calcium 24,5%
Fosfor 9,7%
Magnesium 0,8%

Zusammensetzung
Dicalciumphosphat
Calciumcarbonat
Magnesiumphosphat
Zichorien-Inulin

Analytischen Bestandteile und Gele
Rohprotein 0,5%
Rohöl 5,4%
Rohfaser 1,5%
Rohasche 74,7%
Natrium 0,0%
Calcium 24,5%
Phosphor 9,7%
Magnesium 0,8%

Composition
Phosphate bicalcique
Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
Phosphate de magnésium;
[Phosphate magnésien]
Inuline de chicorée

Composition analytique
Protéine brute 0,5%
Matières grasses brutes 5,4%
Cellulose brute 1,5%
Cendres brutes 74,7%
Sodium 0,0%
Calcium 24,5%
Phosphore 9,7%
Magnésium 0,8%

Additifs per kg:
- Vitamines, provitamines
Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 IU
Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700) 1.000 mg

- Preservatives
Calcium acetate (1a263) 60.000 mg
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Lot no./Best before: See imprint

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Vitaminen, provitamine
Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 IE
Vitamin E (all-rac-alpha-tocopherylacetaat) (3a700) 1.000 mg

- Conservemiddelen
Calciumacetaat (1a263) 60.000 mg
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.
Lotnummer / THT : Zie print

Zusatzstoffe pro kg:
- Vitamine, Provitamine
Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 IE
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) (3a700) 1.000 mg

- Konservierungsmittel
Calciumacetat (1a263) 60.000 mg
Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Batch-Nummer / Mind. haltbar bis: Siehe Druck

Additifs par kg:
- Vitamines, provitamines
Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 UI
Vitamin E (Acétate de tout-rac-α-tocophéryle) (3a700) 1.000 mg

- Conservateurs
Acétate de calcium (1a263) 60.000 mg
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Numéro de lot / A consommer de préférence avant le: Voir Imprimer

ES: Pienso complementario
Dietético para vacas lecheras
Reducción del riesgo de fiebre puerperal y de hipocalcemia subclínica
Se recomienda consultar a un experto en nutrición antes de utilizarlo

Instrucciones de uso
2 bolos 12 a 24 horas antes del parto. 2 bolos inmediatamente después del parto.

IT: Mangime complementare
dietetico per vacche da latte
Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica.
Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso

Istruzioni per l'uso
2 boli da 12 a 24 ore prima del parto. 2 boli subito dopo il parto.

DA: Diætietsk tilskudsfoder til malkekøer
Mindskele af risikoen for melkefeber og subklinisk hypocalcæmi
Det anbefales at indhente udtalelse fra en ernæringssekspert inden brug

Brugsanvisning
2 bolusser 12 til 24 timer før fordring. 2 bolus umiddelbart efter kælvning.

Composición
Fosfato dicalcico
Carbonato de calcio
Fosfato de magnesio
Inulina de achicoria

Componentes analíticos
Proteína bruta 0,5%
Grasa bruta 5,4%
Fibra bruta 1,5%
Ceniza bruta 74,7%
Sodio 0,0%
Calcio 24,5%
Fósforo 9,7%
Magnesio 0,8%

Composizione
Fosfato bicalcico
Carbonato di calcio
Fosfato di magnesio
Inulina di cicoria

Componenti analitici
Proteina grezza 0,5%
Grassi grezzi 5,4%
Cellulosa grezza 1,5%
Ceneri grezze 74,7%
Sodio 0,0%
Calcio 24,5%
Fosforo 9,7%
Magnesio 0,8%

Sammensætning
Dicalciumfosfat
Calciumcarbonat
Magnesiumfosfat
Cikorieinulin

Analytiske bestanddele
Råprotein 0,5%
Råfedt 5,4%
Træstof 1,5%
Råske 74,7%
Natrium 0,0%
Calcium 24,5%
Fosfor 9,7%
Magnesium 0,8%

Aditivos por kg:
- Vitaminas, provitaminas
Vitamina D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 UI
Vitamina E (acetato de todo-rac-α-tocopherol) (3a700) 1.000 mg

- Conservantes
Acetato de calcio (1a263) 60.000 mg
Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

Número de lote / Fecha de caducidad: Ver impronta

Additivi per kg:
- Vitamine, provitamine
Vitamina D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 UI
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocopherile acetato) (3a700) 1.000 mg

- Conservanti
Acetato di calcio (1a263) 60.000 mg
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dal raggi diretti del sole.

Numero di batch / Da consumare entro: Vedere impronta

Tilsetningsstoffer pr kg:
- Vitaminer, provitaminer
Vitamin D3 (Cholecalciferol) (3a671)
250.000 IE
Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700) 1.000 mg

- Konserveringssmidler
Calciumacetat (1a263) 60.000 mg
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Batch-number / Bedst før: se aftryk



Schippers Export EU BV:
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Espana:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmelo 76
08403 Granollers - Barcelona - España
Tel. 935 689 128

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Albano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Download app!
Scan this product



1705331