

EN: H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects P273: Avoid release to the environment. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL:** H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273: Voorzorg lozing in het milieu. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. **DE:** H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR:** H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **ES:** H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional. **DK:** H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273: Undgå udledning til miljøet. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

1908810

EN: Type of preparation:
Other liquids for direct application

Contains:
Chlorhexidine gluconate: 0.8%
Expiry date: 2 years after production date

A. Statutory directions for use
Use is only permitted as a means for drying the umbilical cord of newborn animals. The product is intended for professional use only.

B. User instructions
It is recommended to wear gloves and shake well before use. You can use the spray to spray the navel, or you put the liquid in a dip cup and dip the umbilical cord in this.
Dosage: 1-2 ml per use

NL: Aard van het preparaat:
Andere vloeistoffen voor directe toepassing
Bevat:
chlorhexidinedigluconaat: 0.8%

Uiterste houdbaarheidsdatum:
2 jaar na productiedatum

A. Wettelijke gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het uitdrogen van de navelstreng van pasgeborenen dieren. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiks-aanwijzing
Het is verstandig om handschoenen te dragen en goed te schudden voor gebruik. Je kunt de spray gebruiken om de navel te sprayen of je doet de vloeistof in een dipbeker en dip de navelstreng hierin.
Dosering: 1-2 ml per gebruik

DE: Art der Zubereitung:
Andere Flüssigkeiten zur direkten Anwendung
Enthält:
Chlorhexidindigluconat: 0.8%

Luconat: 0.8%
A. Halbarkeits-datum:
2 Jahren nach Produktionsdatum

A. Gesetzliche Gebrauchsanweisung
Die Verwendung ist zum Trocknen der Nabelschnur von neugeborenen Tieren. Das Mittel ist ausschließlich zur professionellen Verwendung vorgesehen.

B. Gebrauchs-anweisung
Es empfiehlt sich, bei der Anwendung Handschuhe zu tragen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Mittel anzuwenden. Entweder sprühen Sie mit dem Sprühkopf direkt auf den Nabel oder Sie tauchen das Mittel in eine Schale und tauchen den Nabel in die Lösung.
Dosierung: 1-2 ml pro Anwendung

FR: Type de préparation:
Autres liquides pour

application directe
Contient:
chlorhexidine digluconate: 0.8%

Date de péremption: 2 ans après la date de production
A. Utilisation légale
Exclusivement autorisé comme produit pour le séchage du cordon ombilical des animaux nouveau-nés. Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

B. Mode d'emploi
Il est conseillé de porter des gants et de bien agiter avant usage. Utilisez le spray pour pulvériser le produit sur le nombril, ou versez la solution dans un gobelet puis trempez le cordon ombilical.
Dosage: 1-2 ml par usage

ES: Naturaleza del preparado:
Otros líquidos para aplicación directa.
Contiene:
clorhexidina: 0.8g/100g
Fecha de caducidad:

2 años después de la fecha de producción.
A. Especificación de uso legal:

Se deben observar la dosificación y tiempo de remojo indicados en las instrucciones de uso. Para proteger los organismos del agua y del suelo, no está permitido verter residuos con restos del producto en el alcantarillado, el suelo y/o aguas superficiales. Los residuos con restos del producto se deben verter en el almacén de estiércol. Este producto está únicamente indicado para uso profesional.

B. Instrucciones de uso
El producto está listo para su uso y debe utilizarse sin diluir. El producto puede aplicarse por pulverización o por inmersión. Se aconseja usar guantes y agitar bien antes de usar. Puede utilizar el spray para secar el cordón umbilical de los animales recién

nacidos.
Dosificación: 1-2 ml por uso

DK: Type af middel:
Øvrige flydende midler til umiddelbar anvendelse

Indhold:
chlorhexidin digluconat: 0.8%
Sidste holdbarhedsdato: 2 år efter produktionsdato

A. Lovbestemte forskrifter for brug
Udelukkende tilladt at bruge som middel til tørring af navelstrengen hos nyfødte dyr. Midlet er udelukkende beregnet til professionel brug.
B. Brugsanvisning
Det er klogt at bære handsker og ryste godt før brug. Du kan enten bruge sprøjen til at sprøjte navlen med eller putte væsken i et dyppbeholder og dykke navelstrengen i den.
Dosering: 1-2 ml pr. brug

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

The
Schippers
Group

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmélé 76
08403 Granollers
Tel. 935 689 128

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Download app!
Scan this product



1908810



22 LV 01